

ผลิตภัณฑ์

คอมแพ็ค (COMPACT) ป้องกันและกำจัดปลวก

เลขทะเบียน วอส.1330/2554

สารสำคัญ

fipronil 5% W/V SC



คุณสมบัติเฉพาะของคอมแพ็ค

1. สามารถควบคุมปลวกได้อย่างมีประสิทธิภาพ (100% control, No exceptions)
2. เป็นสารที่มีการออกฤทธิ์ในลักษณะปกป้องโครงสร้าง และควบคุมกำจัดปลวกได้แบบตายยกรัง (Structural protection & Colony manage)
3. สามารถออกฤทธิ์ในการป้องกันกำจัดปลวกได้ยาวนาน (Long residual control)
4. ฆ่าปลวกแบบไม่ไล่ปลวก (Non-repellent activity)
5. ออกฤทธิ์กับปลวกโดยทางสัมผัส และระบบทางเดินอาหาร (Contact & Ingestion activity)
6. สามารถกำจัดปลวกได้ด้วยปริมาณสารออกฤทธิ์ในความเข้มข้นที่ต่ำมาก (Effective at ultra low dose rate)
7. สามารถส่งต่อสารออกฤทธิ์จากปลวกตัวที่ได้รับไปให้ปลวกตัวอื่น ๆ ได้ (Transfer between termites)
8. ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environment friendly)

ลักษณะการออกฤทธิ์ของคอมแพ็ค

คอมแพ็ค เป็นสารเคมีป้องกันและกำจัดปลวกที่มีฟิพรอนิล เป็นสารสำคัญ ซึ่งสารตัวนี้จะมีความสามารถในการป้องกันและกำจัดปลวกในระดับความเข้มข้น ของอัตราการใช้ซึ่งมีการออกฤทธิ์ที่แตกต่างกัน โดยในระดับความเข้มข้นต่ำ จะทำให้ปลวกได้รับสารโดยไม่รู้ตัวแล้วนำกลับไปแพร่ที่รัง ส่งผลให้ปลวก ที่อยู่ในรังตายไปด้วย และในระดับความเข้มข้นสูงเปรียบเสมือนการสร้างแนวป้องกันปลวกที่จะทำให้ปลวกตายไปทันที

วิธีใช้ คอมแพ็ค

ควรใช้โดยผู้มีความชำนาญในการกำจัดปลวกเท่านั้น ซึ่งต้องสวมถุงมือ หน้ากาก และอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมทุกครั้งอย่ารับประทานหรือจิบน้ำก่อนใช้ ผสม คอมแพ็ค กับน้ำ ในอัตราส่วน 1:200 เช่น คอมแพ็ค 1 ลิตร ผสมน้ำ 200 ลิตร คนให้เข้ากันดีก่อนนำไปใช้ และใช้คอมแพ็คที่ผสมน้ำแล้ว ให้หมดทุกครั้ง ไม่ควรนำไปเก็บเพื่อใช้ในครั้งต่อไป

วิธีเก็บรักษา

เก็บในที่มืดชื้น ให้ห่างจากเด็ก อาหาร สัตว์เลี้ยง เปลวไฟหรือความร้อน

คำเตือน

1. ห้ามรับประทาน
2. ระงับอย่าให้ คอมแพ็ค เข้าปาก ตา จมูก หรือถูกผิวหนังและเสื้อผ้า
3. ขณะใช้ให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องและสัตว์เลี้ยงออกจากบริเวณนั้น และห้ามเข้าไปจนกว่าคอมแพ็ค พิโพรนิล 5% SC จะแห้งสนิท
4. ขณะรดหรือพ่น ต้องอยู่เหนือลมเสมอ และต้องระวังมิให้คอมแพ็ค พิโพรนิล 5% SC นองหรือไหลออกนอกบริเวณที่ต้องการ
5. ต้องล้างมือและหน้าให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ ก่อนรับประทานอาหาร ดื่มน้ำหรือสูบบุหรี่
6. เมื่อเสร็จจากการใช้คอมแพ็ค พิโพรนิล 5% SC แล้ว ควรรับล้างหน้า ล้างมือ อาบน้ำ สระผม เปลี่ยนเสื้อผ้า และซักชุด ที่สวมทำงานให้สะอาด
7. ภาชนะบรรจุเมื่อใช้หมดแล้ว ห้ามนำกลับมาใช้อีก ให้ทำลาย
8. ห้ามนำภาชนะบรรจุที่ใช้ผสมคอมแพ็ค พิโพรนิล 5% SC ไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น
9. ห้ามล้างภาชนะบรรจุ อุปกรณ์เครื่องพ่น หรือทั้งคอมแพ็ค พิโพรนิล 5% SC ลงในแม่น้ำ คูคลอง แหล่งน้ำสาธารณะ

วิธีแก้ไขเบื้องต้น

1. หากถูกผิวหนังให้ล้างออกด้วยน้ำจำนวนมากๆ ถ้าเปื้อนเสื้อผ้าให้รีบถอดออกแล้วเปลี่ยนใหม่ทันที
2. หากสูดดมให้นำผู้ป่วยออกจากบริเวณที่ใช้ คอมแพ็ค พิโพรนิล 5% SC
3. หากเข้าตาให้รีบล้างตาด้วยน้ำสะอาด จนอาการระคายเคืองทุเลา หากไม่ทุเลาให้รีบไปพบแพทย์
4. หากกลืนกิน คอมแพ็ค พิโพรนิล 5% SC ห้ามทำให้อาเจียน ให้รีบนำส่งแพทย์ พร้อมภาชนะบรรจุ ฉลาก หรือใบแทรกของคอมแพ็ค